

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CALARASI

Raport lunar privind starea factorilor de mediu in judetul Calarasi in luna martie 2017

Capitolul 1. Cadrul natural

Amplasare . Județul Călărași este situat în partea de SE a României învecinându-se cu județele Giurgiu în V, Ilfov în V, Ialomița în NNE, Constanța în SE . La S fluviul Dunărea marchează frontieră de stat cu Republica Bulgaria.

Suprafața 508785 ha

Relieful Dominantă este Câmpia Bărăganului de Sud, Lunca Dunării și Balta Borcei ocupând suprafețe apreciabile .

Reteaua hidrografică :

- Fluvial Dunărea – 150 km ;
- Brațul Borcea – 66 km ;
- Râul Argeș – 37 km ;
- Râul Dâmbovița – 28 km ;
- Lacul Mostiștea – 98 km lungime cu 5700 ha luciu de apă ;
- Lacul Gălățui – 610 ha luciu de apă ;
- Luciu de apă – 17500 ha la nivel județ .

Soluri Predomină cernoziomurile .

Vegetația Dominată vegetația de stepă și silvostepă , cea de luncă și baltă ocupând suprafețe apreciabile .Pădurile ocupă 4 % din suprafața județului și au rol de protecție.

Clima: Temperat – continentală cu regim omogen datorită uniformitatii reliefului .

In luna martie 2017 s-au înregistrat : T min = 1.7 °C
T max = 24.24 °C

(Datele sunt înregistrate de Statia Meteo – RNMCA)

Capitolul 2. Aerul

2.1. Calitatea aerului ambiental in luna martie 2017

Rețeaua de Monitorizare a Calității Aerului din zona Călărași, este formată din două stații automate de monitorizare ce fac parte din Reteaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, echipate cu analizoare performante și care aplică metodele de referință impuse de legislația europeană.Poluanții monitorizați sunt cei prevăzuți în legislația română transpusă din cea europeană, valorile limită impuse prin Legea 104/2011 ,

actualizata, având scopul de a evita, preveni și reduce efectele nocive asupra sănătății umane și a mediului în întregul său.

Reteaua are următoarea structură:

Stația CL1 amplasată in zona Orizont, este stație de trafic și monitorizează influența traficului asupra calității aerului. Poluanții monitorizați: SO₂, NO, NO₂, NOx, CO, PM10 automat și gravimetric, Pb (din PM10), Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line).

Stația CL2 amplasată in zona Stadionului Municipal este stație de fond urban și monitorizează influența așezării urbane asupra calitatii aerului.

Poluanții monitorizați sunt : SO₂, NO, NO₂, NOx, CO, Ozon ,Pb (din PM10), PM10, Benzen, Toluen, O-xilen, Etilbenzen, m, p – xilen (on line). Sunt monitorizati totodata și parametrii meteorologici (direcție și viteză vînt, temperatură, presiune, radiație solară, umiditate relativă, precipitații).

Poluanții monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă și de informare și criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislația națională privind protecția atmosferei și sunt conforme cerințelor prevăzute de reglementările europene.

Interpretarea datelor de calitatea a aerului furnizate de stațiile automate de monitorizare în vederea facilitării informării publicului se face zilnic utilizând indicele general de calitate a aerului conform Ordinului 1095/2007.

In cursul lunii martie 2017 au fost efectuate determinari in sistem automat la statiile de monitorizare a calitatii aerului pentru dioxidul de sulf ,oxidul de carbon , ozon ,pulberi in suspensie si determinari gravimetrice pentru pulberi in suspensie PM10..

In urma determinarilor efectuate nu s-au constatat depasiri ale valorilor limită impuse prin Legea 104/2011,actualizata, pentru poluantii gazosi monitorizati .Depasiri ale valorii limita zilnice(VLZ) s-au inregistrat la ambele statii de monitorizare a calitatii aerului pentru pulberile in suspensie determinate gravimetric, depasiri datorate incalzirii domestice si a traficului intens..

Monitorizarea calitatii aerului prin Statiile apartinand RNMCA

Statia CL-1 Statie de trafic amplasata in zona Orizont – Timp de mediere 1 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [µg/m3]	Numar determinari Valide	Concentratia Medie inregistrata [µg/m3]	Concentratia minima inregistrata [µg/m3]	Concentratia Maxima inregistrata [µg/m3]	Frecventa depasirii %
SO ₂	350	743	9.52	8.21	18.79	0

Statia CL-2 Statie de fond urban amplasata in zona Stadion municipal – Timp de mediere 1 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita [µg/m3]	Numar determinari Valide	Concentratia Medie inregistrata [µg/m3]	Concentratia minima inregistrata [µg/m3]	Concentratia Maxima inregistrata [µg/m3]	Frecventa depasirii %
SO ₂	350	721	12.59	11.15	15.36	0

Statia CL-1 Statie de trafic amplasata in zona Orizont -Timp de mediere 24 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita	Concentratia Medie inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Frecven-ta depasirii %
PM10 grav [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	50	32.01	3.22

Statia CL-2 Statie de fond urban amplasata in zona Stadionului municipal -Timp de mediere 24 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita	Concentratia Medie inregistrata [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	Frecven-ta depasirii %
PM10 grav [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	50	28.09	3.22
PM10 nef $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50	12.61	0


Statia CL-1 Statie de trafic amplasata in zona Orizont -Timp de mediere 8 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita	Concentratia maxima inregistrata	Frecven-ta depasirii %
CO	10	2.44 mg/m ³	0

Statia CL-2 Statie de fond urban amplasata in zona Stadionului municipal -Timp de mediere 8 h

Poluantii monitorizati	Valoarea limita	Concentratia maxima inregistrata	Frecven-ta depasirii %
CO	10	2.19 mg/m ³	0
Ozon	120	99.83 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	0

Evolutia concentratiei pulberilor in suspensie determinate gravimetric este redata in graficul alaturat:



Nu au fost semnalate in luna martie 2017 zone critice sub aspectul calitatii aerului.

2.2. Depuneri atmosferice si precipitatii

Pentru realizarea analizelor de acest tip se utilizeaza prelevatoare pentru depunerile umede (precipitatii) si depunerile totale .

Din depunerile umede se analizeaza pH, conductivitate, sulfati , cloruri si metale grele (Pb), si pentru depunerile totale se determina metalele grele (Pb), conform recomandarilor EMEP, care se realizeaza prin spectrometria de absorbție atomică (AAS) conform standardului SR EN 15841:2010 Calitatea aerului înconjurător: Metoda standardizată pentru determinarea conținutului de arsen, cadmiu, nichel și plumb în depunerile din atmosferă

Determinarile de depuneri umede se realizeaza in punctul de prelevare instalat la APM Calarasi , iar depunerile totale se realizeaza in punctele de prelevare de la statiiile RNMCA CL-1 si CL-2.

In luna martie 2017 s-au recoltat probe de depuneri umede , rezultatele fiind redate in tabelul alaturat:

Rezultatele determinarilor sunt redate in tabelul alaturat :

a. **Depuneri umede (precipitatii)**

Data prelevarii	Indicator	UM	Valoare inregistrata
14.03.2017	pH	Unitati pH	6.45
	Conductivitate	$\mu\text{S}/\text{cm}$	25.61
	SO_4^{2-}	mg/L	3.28
	Cl^-	mg/L	0.49
17.03.2017	pH	Unitati pH	5.96
	Conductivitate	$\mu\text{S}/\text{cm}$	20,29
	SO_4^{2-}	mg/L	2.93
	Cl^-	mg/L	0.71

Capitolul 3. Determinarea zgomotului urban

Nu au fost efectuate determinari de sonometrie datorita expirarii verificarii metrologice a sonometrului.

Capitolul 4. Radioactivitatea mediului

Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Călărași derulează un program de monitorizare a radioactivității mediului de 11 ore /zi. Informațiile legate de nivelul radioactivității la Călărași, pot fi găsite pe site-ul APM Călărași, iar informațiile legate de nivelul radioactivității pentru întreaga țară pot fi găsite la adresa următoare: <http://www.anpm.ro>

Programul standard cât și programul special de recoltări și măsurători, asigură supravegherea radioactivității mediului la nivelul județului Călărași, în scopul detectării creșterii nivelerelor de radioactivitate în mediu și realizării avertizării / alarmării factorilor de decizie.

Valorile de doza gamma înregistrate la cele două stații de monitorizare a radiației gamma, pentru zona de influență a CNE Cernavoda sunt redatate în tabelul de mai jos:

Factorul de mediu monitorizat	U.M.	Minima	Maxima	Media	Valoarea de avertizare conform ordinului MMP nr. 1978 din 19.11.2010
Debitul dozei gamma la sediul APM Calarasi	µ Sv	0.090	0.120	0.097	1 µ Sv
Debitul dozei gamma la Statia Meteorologica Calarasi	µ Sv	0.110	0.140	0.119	1 µ Sv

In cadrul activitatii SSRM Calarasi sunt bine stabilite fluxurile de date zilnice și lunare pentru situații normale, cât și procedurile standard de notificare, avertizare, alarmare, în cazul unor depasiri ale valorilor admise, SSRM Calarasi transmitând înregistrari zilnice și rapoarte lunare către Serviciul Laborator Radioactivitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

In luna martie, SSRM Calarasi a executat conform programului standard stabilit de SLR _ ANPM urmatoarele masuratori:

- **in cadrul programului standard** au fost efectuate 312 analize pe un numar de 128 de probe de mediu din care:
 - 61 probe de aerosoli
 - 31 probe de depuneri atmosferice
 - 31 probe de apa de suprafata
 - 5 probe de sol

In cadrul programului standard la masuratorile imediate (flux rapid), pe fiecare factor de mediu monitorizat s-au inregistrat urmatoarele valori:

Factorul de mediu monitorizat	U.M.	Minima	Maxima	Media	Valoarea de avertizare conform ordinului MMP nr. 1978 din 19.11.2010
Aerosoli atmosferici aspiratia 02- 07	Bq/m ³	0.87	8.83	3.37	50 Bq/m ³
Aerosoli atmosferici aspiratia 08- 13	Bq/m ³	0.47	3.82	1.44	50 Bq/m ³
Depuneri atmosferice	Bq/ m ² / zi	0.39	16.94	1.59	1000 Bq/ m ² / zi
Apa de suprafata	Bq/ m ³	0.12	0.52	0.15	2000 Bq/ m ³
Solul	Bq/g	0.24	0.46	0.35	

Reziduurile obtinute din pregatirea probelor cat si filtrele de aerosoli aspirate au fost trimise la SLR_ANPM in vederea masuratorilor gamma spectrometrice.

- **In cadrul programului special** au fost efectuate 62 de masuratori beta globale pe un numar de 31 de probe de apa de foraj.

In cadrul programului special la masuratorile imediate (flux rapid), pe fiecare factor de mediu masurat s-au inregistrat urmatoarele valori:

Factor de mediu monitorizat	U. M.	Minima	Maxima	Media	Valoarea de avertizare conform ordinului MMP nr. 1978 din 19.11.2010
Apa de foraj	Bq/m ³	0.12	0.14	0.13	1000 Bq/m ³

Reziduurile obtinute au fost trimise pentru masuratori gamma spectrometrice la SLR – ANPM.

In cadrul programului special de monitorizare a CNE Cernavoda au fost trimise catre SLR – ANPM in vederea analizelor spectrometrice beta (T si C14) urmatoarele probe:

- 5 probe de apa de foraj
- 1 proba cumulata de precipitatii atmosferice
- 1 proba cumulata de apa de suprafata (brat Borcea- Dunare)

In luna martie 2017, radioactivitatea mediului in judetul Calarasi s-a incadrat in limitele de variație a fondului natural.

Capitolul 5. Biodiversitatea

Nu au fost semnalate probleme deosebite legate de flora si fauna judetului in cursul lunii martie 2017.

Capitolul 6. Deșeuri. Substanțe și preparate chimice periculoase

Cantitatea de deseuri generata , colectata/valorificata/eliminata in luna martie 2017 este prezentata sintetic in tabelul alaturat :

Nr crt	Denumire deseu	Cantitate / tone			Stoc/ tone
		colectata	valorificata	eliminata	
1	MENAJER TOTAL	2105,87		2105,87	
1.1	Menajer in amestec de la populatie	967,32		967,32	
1.2	Menajer in amestec de la institutii si agentii economici	1138,55		1138,55	
2	DIN SERVICII TOTAL	862,33		862,33	
2.1	Stradale	807,98		807,98	
2.2	Piete si oboare	54,35		54,35	
3	COLECTARE SELECTIVA	466,69	466,69		
3.1	Nr puncte colectare selectiva de la populatie				
3.2	Total colectare selectiva de la institutii si agentii economici				
3.2.1	Hartie/carton	37,3	37,3		
3.2.2	Plastic (PET/PE/HDPE/folie)	15,17	15,17		
3.2.3	Sticla	0,12	0,12		
3.2.4	Metal	414,2	414,2		
4	CONSTRUCTII SI DEMOLARI	122,50		122,50	
5	INDUSTRIAL	37,8		37,8	

6	Pamant si pietre	0		0	
7	Lemn	0,30		0,30	
8	Deseuri medicale	8,14		8,14	

DIRECTOR EXECUTIV

Silviu Cristian ANCULESCU

Intocmit,
Cristina TUDOR

Cristina Tudor



ŞEF SERVICIU MONITORIZARE
ŞI LABORATOARE
Elena ADRIAN

Elena Adrian